

Coban™ 90

TM

(monensin Type A medicated article)Net Weight **25 kg**
(55.12 lb)**For Use in Broiler and Layer Replacement Chicken, Growing Turkey, and Growing Bobwhite Quail Feeds Only****Do not feed undiluted.****Active Drug Ingredient** – Monensin, USP – 90.7 g per pound.**Broiler and Layer Replacement Chickens:** As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, and *E. maxima*.**Turkeys:** For the prevention of coccidiosis in turkeys caused by *Eimeria adenoeides*, *E. meleagrimitis* and *E. gallopavonis*.**Quail:** For the prevention of coccidiosis in growing Bobwhite quail caused by *Eimeria dispersa* and *E. lettyae*.**Important: Must be thoroughly mixed in feeds before use. Mix thoroughly Coban 90 with a small quantity of non-medicated feed (e.g., 1 lb with 100-200 lb) before incorporation into the Type C medicated feed.****Mixing Directions (Broiler and Layer Replacement Chickens)** – Thoroughly mix the following amounts of Coban 90 with a sufficient quantity of unmedicated feed to make one ton of complete chicken feed to provide 90 through 110 grams monensin per ton.

Monensin (Grams Per Ton)	Coban 90 (Lbs Per Ton of Type C Feed)
90	0.99
95	1.05
100	1.10
105	1.16
110	1.21

Feeding Directions – Feed continuously as the sole ration.**Mixing Directions (Turkeys)** – Thoroughly mix the following amounts of Coban 90 with a sufficient quantity of unmedicated feed to make one ton of complete turkey feed to provide 54 through 90 grams monensin per ton.

Monensin (Grams Per Ton)	Coban 90 (Lbs Per Ton of Type C Feed)
54	0.60
66	0.73
78	0.86
90	0.99

Feeding Directions – For growing turkeys only, feed continuously as the sole ration. The optimum level depends upon the severity of coccidiosis exposure.**Mixing Directions (Bobwhite Quail)** – Thoroughly mix the following amounts of Coban 90 with a sufficient quantity of unmedicated feed to make one ton of complete quail feed to provide 73 grams monensin per ton.

Monensin (Grams Per Ton)	Coban 90 (Lbs Per Ton of Type C Feed)
73	0.80

Feeding Directions – For Bobwhite quail, feed continuously as the sole ration.**NOT FOR HUMAN USE****Warning:** Do not feed to laying chickens. Do not feed to chickens over 16 weeks of age. When mixing and handling Coban 90, use protective clothing, impervious gloves, and a dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after handling. If accidental eye contact occurs, immediately rinse thoroughly with water.**Caution:** Do not allow horses, other equines, mature turkeys, or guinea fowl access to feed containing monensin. Ingestion of monensin by horses and guinea fowl has been fatal. Some strains of turkey coccidia may be monensin tolerant or resistant. Monensin may interfere with development of immunity to turkey coccidiosis. In the absence of coccidiosis in broiler chickens the use of monensin with no withdrawal period may limit feed intake resulting in reduced weight gain. Not for replacement chickens intended to become broiler breeding chickens.**Store at or below 25 °C (77 °F). Excursions permitted to 37 °C (99 °F).****Not to be used after the date printed on bag.**

Restricted Drug (California) – Use Only as Directed

NADA #s 38-878 and 130-736, Approved by FDA

Elanco, Coban and the diagonal bar are trademarks owned or licensed by Eli Lilly and Company, its subsidiaries or affiliates.

**Elanco Animal Health • A Division of Eli Lilly and Company
Indianapolis, IN 46285, U.S.A.**

To report adverse effects, access medical information, or obtain additional product information call 1-800-428-4441.

**Coban™ 90**

TM

(monensina tipo A artículo medicado)Peso neto **25 kg**
(55.12 lb)**Sólo para uso en el alimento de pollos de engorde, pollonas capa de reemplazo, codornices y pavos en crecimiento****No administrar sin diluir.****Ingrediente activo** – Monensina, USP: 90.7 g/lb**Pollos de engorde y pollona capa de reemplazo:** Como auxiliar en la prevención de coccidiosis causada por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.**Pavos:** Para la prevención de coccidiosis en pavos causada por *Eimeria adenoeides*, *E. meleagrimitis* y *E. gallopavonis*.**Codornices:** Para la prevención de coccidiosis en crecimiento codornices causada por *Eimeria dispersa* y *E. lettyae*.**Importante: Debe mezclarse por completo con el alimento antes de usarse. Mezclar completamente Coban 90 con una pequeña cantidad de alimento no medicado (p. ej., 1 lb con 100-200 lb) antes de la incorporación en el alimento medicado Tipo C.****Instrucciones para el mezclado (pollos de engorde y pollona capa de reemplazo)** – Mezclar bien las siguientes cantidades de Coban 90 con una cantidad suficiente de alimento no medicado a fin de completar una tonelada que contenga de 90 a 110 gramos por tonelada corta.

Monensina (Gramos por tonelada)	Coban 90 (Libras por tonelada de Alimento Tipo C)
90	0.99
95	1.05
100	1.10
105	1.16
110	1.21

Instrucciones de administración – Usar continuamente como única ración.**Instrucciones de mezclado (pavos)** – Mezclar bien las cantidades siguientes de Coban 90 con cantidades suficientes de alimento no medicado a fin de completar una tonelada que contenga de 54 a 90 gramos de monensina por tonelada corta.

Monensina (Gramos por tonelada)	Coban 90 (Libras por tonelada de Alimento Tipo C)
54	0.60
66	0.73
78	0.86
90	0.99

Instrucciones de administración – Sólo para pavos en crecimiento, proporcionar continuamente como única ración. La concentración óptima dependerá de la severidad de la exposición a la coccidiosis.**Instrucciones de mezclado (Codornices)** – Mezclar bien las siguientes cantidades de Coban 90 con una cantidad suficiente de alimento no medicado a fin de completar una tonelada corta de alimento completo para codorniz, que proporcione 73 gramos de monensina por tonelada.

Monensina (Gramos por tonelada)	Coban 90 (Libras por tonelada de Alimento Tipo C)
73	0.80

Instrucciones de administración – Para codornices usar continuamente como única ración.**NO USAR EN SERES HUMANOS****Advertencia:** No administrar a ponedoras en producción. No proporcionar a aves de más de 16 semanas de edad. Cuando se mezcle y manipule Coban 90 se deberá usar ropa protectora, guantes impermeables y mascarilla antipolvo. Los operarios deben lavarse bien con agua y jabón después de manejar este producto. En caso de contacto ocular, deberá enjuagarse, de inmediato, con abundante agua.**Precaución:** No permitir que caballos, otros equinos, pavos adultos o gallinas de guinea ingieran alimento que contenga monensina. La ingestión de monensina por parte caballos y gallinas de guinea ha sido fatal. Algunas cepas de coccidia de pavos pueden ser tolerantes o resistentes a la monensina. La monensina puede interferir con el desarrollo de inmunidad a la coccidiosis de los pavos. En ausencia de coccidiosis en pollos de engorde, el uso de monensina sin período de retiro puede limitar el consumo de alimento y dar lugar a una reducción en la ganancia de peso. No para los pollos de recambio destinado a convertirse en pollos de cría de pollos de engorde.**Conservar a una temperatura igual o menor a 25 °C (77 °F).****Variaciones permitidas hasta 37 °C (99 °F).****No debe utilizarse después de la fecha impresa en la bolsa.**

Medicamento Restringido (California) – Usar sólo según indicaciones.

NADA #s 38-878 y 130-736, Aprobado por la FDA.

**Elanco Animal Health • División de Eli Lilly and Company
Indianápolis, Indiana 46285 Estados Unidos de América**

Para comunicar sobre efectos adversos, tener acceso a información médica u obtener información adicional acerca del producto, llamar al 1-800-428-4441.

Elanco, Coban y la barra diagonal son marcas registradas o autorizadas por Eli Lilly and Company sus subsidiarias o afiliadas.