

DIN 02252724

Code 992052

Dexafer-200

ACTIVE INGREDIENT: Each mL contains the equivalent of 200 mg of iron as ferric hydroxide dextran complex.

Preservative: Phenol 0.5% W/V

INDICATIONS: For the prevention and treatment of iron deficiency anaemia in new-born piglets.

DIRECTIONS FOR USE: For the prevention and treatment of iron deficiency anaemia in baby pigs, inject 1 mL (200 mg iron) intramuscularly, preferably in the neck region. Disinfect the site of injection with iodine or alcohol before injecting.

CAUTIONS: If symptoms of iron deficiency persist, consult a veterinarian.

STORAGE: Store at room temperature (between 15°C and 25°C). Avoid freezing.

Vetoquinol N.-A. Inc.
2000, ch. Georges
Lavaltrie, QC, Canada J5T 3S5



42012-01-01


52080071-001

**STERILE IRON DEXTRAN
20% W/V SOLUTION
FOR INJECTION,
Mfr. Std.**

**Veterinary Use
Only**

**SOLUTION STÉRILE
DE FER DEXTRAN
INJECTABLE À 20% P/V
Norme du fabricant**

**Usage vétérinaire
seulement**



INGRÉDIENT ACTIF : Chaque mL contient l'équivalent de 200 mg de fer sous forme de complexe d'hydroxyde ferrique dextran.
Agent de conservation : Phénol 0,5% p/v

INDICATIONS : Pour la prévention et le traitement de la carence en fer chez le porcelet nouveau-né.

MODE D'EMPLOI : Pour la prévention et le traitement de l'anémie causée par une carence en fer chez le porcelet nouveau-né, injecter 1 mL (200 mg de fer) par voie intra-musculaire, préférentiellement dans la région du cou. Désinfecter le site d'injection avec de l'iode ou de l'alcool avant l'injection.

PRÉCAUTIONS : Si les symptômes de carence en fer persistent, consulter un vétérinaire.

ENTREPOSAGE : Conserver à la température de la pièce (entre 15°C et 25°C). Éviter le gel.

Lot:

Exp.: