


DRYGIENE™

DRYGIENE™ – Healthier, happier animals
through better barn hygiene.



SUPER-ABSORBENT
DRYING POWDER

SUPPRESSES AMMONIA

ANTI-BACTERIAL

SAFE AND ALL-NATURAL

IMPROVES BARN HYGIENE

IMPROVES ANIMAL HEALTH

NET WEIGHT 50LB. (22.68KG)

DRYGIENE™

DIRECTIONS FOR USE

Apply to wet or damp areas at the rate of 2oz. to 4oz. per square yard weekly or as needed. Amount and frequency of application can be altered as needed without risk.

SWINE: Use 4oz. to 6oz. per square yard in farrowing, nursery and finishing after washing and disinfecting. Use liberally on newborn piglets and heat mats beginning at birth and for the first week after farrowing. Weekly application of 2oz. per square yard in nursery and finishing is also recommended for bacterial control and ammonia reduction.

POULTRY: Apply at a rate of 2-4oz. per square yard in clean rooms before filling.

Add as needed to maintain dryness and reduce ammonia. DRYGIENE™ can be mixed with bedding when starting a barn as well.

DAIRY AND BEEF CATTLE/CALVES: Apply 4-5oz. per square yard on floors or on top of bedding. Repeat weekly or as needed. Horses: Apply 4-6oz. per square yard on floors or on top of bedding. Repeat weekly or as needed.

TRUCKS/TRAILERS: Apply 4-6oz. per square yard after washing and disinfecting. Storage and Handling: Keep container closed and store in a cool, dry area. As with any fine powder, proper personal protective equipment should be worn during application. Keep out of reach of children.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar DRYGIENE™ en zonas húmedas o mojadas, a razón de 50 a 100 g/m2, por semana o según sea necesario. La cantidad y frecuencia de la aplicación se pueden modificar según sea necesario sin riesgo alguno.

PORCINOS: Aplicar 100 a 150 g/m2 en la sala de parto, de engorde, y acabado, también después del lavado y desinfección antes de la llegada de un nuevo lote de cerdos. Utilizar en abundancia en los lechones recién nacidos, en los tapetes durante el nacimiento y la primera semana después del parto. Aplicar semanalmente de 50 g/m2 en la sala de Parto y engorde, para el control de bacterias y la reducción de amoníaco.

AVES: Aplicar a razón de 50 a 100 g/m2 en salas limpias antes de llenar con aves. Añadir según sea necesario para mantener la sequedad y reducir el amoníaco. DRYGIENE™ se puede mezclar con la capa de cama al iniciar un nuevo lote de aves.

Ganado de leche y carne/ Terneros: Aplicar 100 g/m2 de DRYGIENE™ en los pisos o en la parte superior de la cama. Repita semanalmente o cuando sea necesario.

CABALLOS: Aplicar 100 a 150 g/m2 en los pisos o en la parte superior de la cama. Repita semanalmente o cuando sea necesario.

CAMIONES/TRAILERS: Aplicar 100 a 150 g/m2 después del lavado y desinfección.

Almacenamiento y Manejo: Mantenga el envase cerrado y almacenar en un lugar fresco y seco. Al igual que con cualquier polvo fino, debe usarse un equipo de protección personal durante la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños.

Cerdos, LLC
darin@cerdosllc.com
www.drygiene.com

NET WEIGHT 50LB. (22.68KG)

