

Starter Pack WS

A source of micronutrients and functional amino acids to support hydration, gut health, and the immune system in pigs of all ages.

Control Number: 10189-136
Net Weight: 25 lbs (11.34 kg)

Lot No:
MFG:

Manufactured For:



TechMix, LLC. • PO Box 221, Stewart, MN 55385
877-466-6455 • www.techmixglobal.com

GUARANTEED ANALYSIS

Crude Protein	Min	16.00%	Salt (NaCl)	Min	2.80%
Calcium (Ca)	Min	0.10%	Salt (NaCl)	Max	3.80%
Calcium (Ca)	Max	0.20%	Selenium (Se)	Min	10.0 ppm
Phosphorus (P)	Min	0.50%	Vitamin A	Min	132,545 IU/lb
			Vitamin E	Min	4,648 IU/lb

INGREDIENTS

Dried Whey Solubles, Monosodium Glutamate, Ascorbic Acid, Dextrose, Potassium Chloride, Salt, dl- α -Tocopheryl Acetate (source of Vitamin E), Sodium Aluminosilicate, Monosodium Phosphate, Vitamin B12 Supplement, Artificial Flavor, Thiamine Mononitrate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K Activity), Vitamin A Acetate, 25-Hydroxyvitamin D3, Selenomethionine Hydroxy Analogue, Glycine, L-Arginine, Whey Protein Concentrate, Whey Product, Lactose.

DIRECTIONS FOR USE/INSTRUCCIONES DE USO

Pre-Weaned Pig: Days 2-8 of age: Mix 5 ounces (2/3 scoop) per 1 gallon (3.8 L) of water.

Wean and Post-wean Pig:

- **Drinking Water:** Mix 4 scoops (2 lbs) per 1 gallon of water to prepare a stock solution. Provide the stock solution through a proportioner set at 1:128 for 5-7 days. Mix only enough stock solution for one day's use.
- **Gruel Feeding:** Mix 5 ounces (2/3 cup) per 1 gallon of water. Provide the solution in a trough, gradually transitioning from liquid to solid feed over 5 days. Provide gruel amount as needed so all is consumed in 20 minutes.

- **Top Dress:** Top dress 1 ounce of product per feeder for 3 days to attract pigs to the feed.

Feeder Pigs: **Drinking Water:** Mix 8 scoops (4 lbs) per 5 gallons of water to prepare a stock solution. Provide the stock solution through a proportioner set at 1:128 for 3 days. Mix only enough stock solution for one day's use.

Sows - Prefarrow-Lactation: **Drinking Water:** Mix 6 scoops (3 lbs) per 5 gallons of water to form a stock solution. Provide the stock solution through the proportioner set at the rate of 1:128. Mix only enough stock solution for 1-day use. Administer the solution from room load-in through the entire lactation period.

For optimal results: When administered in the drinking water for a new group of pigs in a barn or sows in a farrowing room, ensure water lines are purged properly so that the product is readily available.

Lechón Pre-Destete: Días 2-8 de edad: Mezclar 5 onzas (2/3 de medida) por 1 galón (3.8 L) de agua.

Lechón Destetado y Post-Destete:

- **Agua de bebida:** Mezclar 4 medidas (2 lbs) por 1 galón de agua para preparar una solución madre. Suministrar la solución madre a través de un proporcionador ajustado a 1:128 durante 5-7 días. Mezclar solo la cantidad de solución madre necesaria para un día de uso.
- **Alimentación en papilla:** Mezclar 5 onzas (2/3 de medida) por 1 galón de agua. Ofrecer la solución en un comedero, haciendo una transición gradual de líquido a alimento sólido en un periodo de 5 días. Suministrar la cantidad de papilla necesaria para que sea consumida en 20 minutos.
- **Aplicación encima del alimento (Top-Dress):** Espolvorear una onza de producto por comedero durante 3 días para atraer a los lechones al alimento. Una medida rinde 8 comederos.

Cerdos en Crecimiento: **Agua de bebida:** Mezclar 8 medidas (4 lbs) por 5 galones de agua para preparar una solución madre. Suministrar la solución madre a través de un proporcionador ajustado a 1:128 durante 3-5 días. Mezclar solo la cantidad de solución madre necesaria para un día de uso.

Cerdas - Pre-Parto y Lactancia: **Agua de bebida:** Mezclar 6 medidas (3 lbs) por 5 galones de agua para formar una solución madre. Suministrar la solución madre a través del proporcionador ajustado a 1:128. Mezclar solo la cantidad de solución madre necesaria para 1 día de uso. Administar la solución desde que las cerdas se mueven a la sala de parto hasta el final del periodo de lactancia.

Para obtener resultados óptimos: Cuando se administre en el agua de bebida a un nuevo grupo de lechones en una granja o a cerdas en una sala de maternidad, asegurarse de purgar correctamente las líneas de agua para que el producto esté disponible inmediatamente.

Caution statements: Avoid contact with eyes. Product may cause allergic reaction. If on skin, wash with soap and water. Seek medical attention if irritation continues.

STORAGE

Store in a dry room at temperatures between 40°F (4°C) and 86°F (30°C).

0201902025